

Styczeń 27, 2025 r. [Przejęcie przez agencję](#) [Cenzura/inwigilacja](#) [Aktualności](#)

Narażenia toksyczne

"Oszałamiające" badanie wykazało, że zaszczepione dzieci mają o 170% wyższe ryzyko autyzmu

Recenzowane badanie wykazało również, że zaszczepione dzieci miały o 212% większe prawdopodobieństwo wystąpienia innych zaburzeń neurorozwojowych, w tym ADHD, epilepsji / drgawek, zaburzeń mózgu. inflammation and tic and learning disorders.

[Michael Nevradakis, Ph.D.](#)

27 stycznia 2025 r.



Według nowego, [recenzowanego badania](#), zaszczepione dzieci mają o 170% większe szanse na zdiagnozowanie autyzmu w porównaniu z dziećmi niezaszczepionymi.

Badanie wykazało również, że zaszczepione dzieci miały o [212% większe prawdopodobieństwo](#) wystąpienia szeregu innych zaburzeń neurorozwojowych, w tym zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), padaczki / drgawek, zapalenia mózgu oraz [tików](#) i zaburzeń uczenia się.

Według badania, [harmonogram szczepień dzieci](#) jest prawdopodobnie istotnym czynnikiem przyczyniającym się do wyższego wskaźnika autyzmu i chorób neurorozwojowych u zaszczepionych dzieci.

Badanie 47 155 9-letnich dzieci zapisanych do programu Florida Medicaid od urodzenia zostało opublikowane 23 stycznia w czasopiśmie Science, Public Health Policy and the Law.

Dr Karl Jablonowski, starszy badacz w [Children's Health Defense](#), powiedział, że artykuł "jest nie do odrzucenia po prostu ze względu na solidność jego metod".

"Samo zagrożenie związane z poważnymi chorobami wieku dziecięcego jest oszałamiające" - powiedział Jablonowski.

Autorzy artykułu - Anthony R. Mawson i Binu Jacob z Chalfont Research Institute w Mississippi - postawili hipotezę, że:

- Szczepienia w dzieciństwie są związane z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi.
- Rosnąca liczba szczepień prowadzi do wyższego ryzyka autyzmu.
- Szczepione wcześniaki są bardziej narażone na zaburzenia neurorozwojowe niż dzieci nieszczepione.

Wyniki badania potwierdziły hipotezy autorów. Eksperci stwierdzili, że wyniki badania podają w wątpliwość twierdzenia rządu, że szczepionki nie są powiązane z autyzmem.

"The vaccine propaganda campaigns operated by our [regulatory agencies](#), [pharmaceutical companies](#), and [legacy media](#) continue to claim that the link between vaccines and autism has been 'debunked,'" said epidemiologist Nicolas Hulscher. He said the findings of this study "completely dismantle" this narrative.

Jablonowski noted that the study was based solely on government data. He said:

"Rząd posiada te dane od dziesięcioleci, twierdząc, że są one bezpieczne, a jednocześnie odmawiając ich zbadania. Fasada zdrowia publicznego rządu USA rozpada się, ujawniając winowajcę [chorób przewlekłych](#) w tym kraju: umyślną ignorancję".

Autorzy badania zauważyli, że w badaniach sponsorowanych przez rząd nie porównywano wyników [zdrowotnych](#) dzieci zaszczepionych i niezaszczepionych. Mawson i Jacob powiedzieli The Defender, że mają nadzieję, że rząd zainicjuje takie badania.

Harmonogram szczepień dzieci może być czynnikiem wpływającym na częstsze diagnozowanie autyzmu

Badanie wykazało, że we wszystkich wskaźnikach zaszczepione dzieci miały wyższy wskaźnik zaburzeń neurorozwojowych w porównaniu z tymi, które pozostały niezaszczepione. Zgodnie z wynikami:

- Względne ryzyko wystąpienia zaburzeń neurorozwojowych rośnie wraz ze wzrostem liczby wizyt lekarskich obejmujących szczepienia. Prawdopodobieństwo zdiagnozowania autyzmu u dzieci, które odbyły tylko jedną wizytę szczepienną, było 1,7 razy większe niż w przypadku dzieci niezaszczepionych.
- Dzieci z 11 lub więcej wizytami szczepiennymi były o 340% bardziej narażone na zdiagnozowanie autyzmu w porównaniu do dzieci niezaszczepionych i o 89% bardziej narażone na zdiagnozowanie autyzmu w porównaniu do dzieci z jedną wizytą szczepienną.
- Zaszczepione dzieci, które urodziły się przedwcześnie, były o 258% bardziej narażone na zdiagnozowanie u nich co najmniej jednego zaburzenia neurorozwojowego w porównaniu do dzieci urodzonych przedwcześnie, które pozostały niezaszczepione. U prawie 40% zaszczepionych wcześniaków zdiagnozowano takie zaburzenie, w porównaniu do 15,7% niezaszczepionych dzieci.
- Zaszczepione dzieci były o 419% bardziej narażone na zdiagnozowanie encefalopatii (zapalenie mózgu), o 525% bardziej narażone na rozwój zaburzeń tikowych i 581% bardziej narażone na trudności w uczeniu się, w porównaniu do dzieci niezaszczepionych.
- Wśród dzieci urodzonych przedwcześnie, które zostały następnie zaszczepione, ryzyko zapalenia mózgu i trudności w nauce wzrosło odpowiednio o 612% i 884%.

"Podczas gdy związek między przyjmowaniem szczepionek a autyzmem budzi poważne obawy wielu rodziców, badanie to jasno pokazuje, że nawet w przypadku braku diagnozy autyzmu, mózgi dzieci są uszkodzane" - powiedziała dr Christina Parks, biolog.

Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC) częstość występowania autyzmu wzrosła z 1 na 1000 dzieci w latach 90. do [1 na 36](#). Autorzy badania zauważyli, że wzrost ten jest powszechnie przypisywany większej świadomości objawów związanych z autyzmem i [większej ekspozycji na toksyczne chemikalia](#).

Autorzy stwierdzili jednak, że ich wyniki sugerują, że harmonogram szczepień dzieci może być również kluczowym czynnikiem stojącym za gwałtownym wzrostem liczby diagnoz autyzmu.

"Geograficznie rozpowszechniony wzrost ASD [zaburzeń ze spektrum autyzmu] i ADHD sugeruje rolę czynnika środowiskowego, na który narażone są praktycznie wszystkie dzieci. Jednym z takich czynników są rutynowe szczepienia dzieci" - zauważono w badaniu.

Autorzy przytoczyli dane liczbowe pokazujące, że liczba szczepionek zawartych w [najnowszym harmonogramie CDC dla dzieci w USA](#) wzrosła prawie trzykrotnie w porównaniu z harmonogramem szczepień z 1983 roku.

"Chociaż mówi się, że szczepienia są bezpieczne i skuteczne dla zdecydowanej większości dzieci, uzasadnione jest pytanie, czy rozszerzony harmonogram może w jakiś sposób przyczyniać się do wzrostu wskaźników NDD [zaburzeń neurorozwojowych]" - stwierdzono w badaniu.

"Wszelkie planowane dodatki do harmonogramu szczepień dzieci powinny zostać opóźnione do czasu zakończenia badań mających na celu określenie bezpieczeństwa ich wpływu na ogólny stan zdrowia dzieci" - stwierdzili Mawson i Jacob.

Według badania, wpływ szczepień na dzieci urodzone przedwcześnie nie został wystarczająco zbadany.

"Możliwość niekorzystnego wpływu szczepień na wcześniaki mogła zostać przesłonięta przez główne znaczenie przypisywane szczepieniom w zapobieganiu infekcjom noworodkowym" - stwierdzono w badaniu.

Recenzowane badanie opublikowane na początku tego miesiąca wykazało, że wcześniaki, które otrzymały rutynowe 2-miesięczne szczepienia, miały o 170% [wyższą częstość występowania bezdechu](#) w porównaniu z dziećmi nieszczepionymi.

W badaniu zauważono również, że podczas gdy badania często próbowały powiązać rosnące wskaźniki autyzmu z konkretnymi szczepionkami, mniej było badań badających możliwy związek między skumulowanym harmonogramem szczepień dzieci a autyzmem.

"Związek między szczepieniami a ASD może wynikać ze skumulowanego wpływu wszystkich poprzednich szczepień, a nie tylko konkretnej szczepionki" - stwierdzono w badaniu. "ASD i inne NDD mogą być wywołane przez ostatnią podaną szczepionkę lub przez jedną lub więcej z serii szczepień".

"Istnieje pilna potrzeba badań w celu zidentyfikowania mechanizmów biologicznych i potencjalnych związków przyczynowych między poszczególnymi szczepionkami, kombinacjami szczepionek i innymi potencjalnymi czynnikami związanymi z zaburzeniami neurorozwojowymi" - powiedzieli Mawson i Jacob.

Hulscher powiedział, że badanie sugeruje, że obecny "harmonogram hiper-szczepień CDC wymaga całkowitego przeglądu". Dodał: "Nie tylko prawdopodobnie przyczynia się do epidemii autyzmu i chorób przewlekłych, ale prawie wszystkie szczepionki zostały dopuszczone do obrotu bez odpowiednich długoterminowych badań kontrolowanych placebo".

Parks said the study's results reinforce the importance of parental choice.

"Istnieją jednak pewne ustalenia, które rodzice mogą uznać za pocieszające" - powiedział Parks. "Podczas gdy wcześniaki są wyjątkowo podatne na encefalopatię i drgawki, jeśli rodzice zdecydowali się ich nie szczepić, statystycznie nie były one bardziej narażone na rozwój zaburzeń neurorozwojowych niż niemowlęta urodzone o czasie".

Według [raportu CDC z września 2024 r.](#), [wskaźniki szczepień](#) wśród dzieci urodzonych w 2020 i 2021 r. były niższe niż w przypadku dzieci urodzonych w 2018 i 2019 r. Hulscher powiedział, że coraz więcej Amerykanów zdaje sobie sprawę z ryzyka związanego ze szczepieniami dzieci.

"Amerykańska opinia publiczna staje się coraz bardziej świadoma rzeczywistego ryzyka związanego ze szczepionkami" - powiedział Hulscher. Przypisał rosnącą nieufność "klęsce wstrzyknięcia mRNA [COVID-19](#), która zabiła, zraniła lub trwale upośledziła miliony ludzi".

Hulscher powiedział, że wyniki badania "gwarantują dalsze badania przez nową administrację USA".

Powiązane artykuły w The Defender

- ['Vaccines Do Not Cause Autism' Claim Built on 'House of Cards,' Authors of New Review Say](#)
- [Parents With High Chemical Intolerance 6 Times More Likely to Have Child With Autism](#)
- [What Most Autism Research Gets Wrong — and Why That Might Change](#)
- [1 in 33 Kids Ages 5 to 8 — More Than Previously Thought — Has Autism](#)
- [5 Scientific Findings Explain Link Between Vaccines and Autism — Why Do Health Agencies Ignore Them?](#)



[Michael Nevradakis, Ph.D.](#)

Michael Nevradakis, Ph.D., mieszkający w Atenach, w Grecji, jest starszym reporterem The Defender i gospodarzem programu "The Defender In-Depth" na CHD.TV.